

Errata do wydrukowanych Polskich Norm

ICS 11.080.20, 71.100.36

Część nakładu PN-EN 1276:2000 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne – Ilościowa zawieszinowa metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej – Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)

Poprawna treść Załącznika C ze strony 25.

Płyny płuczące

Może być użyty każdy z następujących płynów:

- woda (patrz 5.2.2.2);
- rozcieńczalnik (patrz 5.2.2.4);
- wodny roztwór 0,1 % (V/V) polisorbatu 80 ⁵⁾;
- wodny roztwór 0,5 % (V/V) polisorbatu 80 ⁵⁾;
- wodny roztwór 0,5 % (V/V) polisorbatu 80 ⁵⁾ i 0,7 g/l lecytyny;
- neutralizator (patrz 5.2.2.5);
- roztwory buforowe.

UWAGA: Podana lista nie jest pełna i mogą być stosowane inne płyny.

Neutralizator dodawany do agaru do liczenia:

- 10 % (V/V) roztworu zawierającego 0,7 g/l lecytyny i 5 % (V/V) polisorbatu 80 ⁵⁾;
- 10 % (V/V) roztworu zawierającego 10 g/l lecytyny i 5 % (V/V) polisorbatu 80 ⁵⁾;
- 10 % (V/V) roztworu zawierającego żółtko świeżego jaja 1,5 % (V/V) i 5 % (V/V) polisorbatu 80 ⁵⁾.

Normalizacja 12/2001